

附件 2:

辽宁省基本医疗保险急危重病异地就医 结算参考病种及关键标准

符合以下疾病诊断且满足关键标准的,异地联网定点医疗机构可上传“门诊急诊转诊标志”或“住院类型”为“急诊”。

一、循环系统

(一) 心脏骤停

关键标准:行心肺复苏或气管插管治疗。

(二) 急性冠脉综合征

关键标准:符合以下任意一种情形,发病 12 小时内肌酸激酶同工酶(CK-MB)动态增高且达到正常值上限 4 倍及以上;发病 12 小时内肌钙蛋白动态升高且达到正常值上限 4 倍及以上。

(三) 致命性心律失常

关键标准:心电图显示以下任意一种情形,心室颤动(室颤);室性心动过速(室速);心室扑动(室扑);房室交界区性心动过速(室上速);快速心房颤动(房颤)心率 >150 次/分;二度 II 型房室传导阻滞;三度房室传导阻滞;窦性心动过缓心率 <40 次/分;病态窦房结综合征;窦性停搏。

(四) 高血压危象

关键标准:舒张压 ≥ 130 mmHg(或收缩压 ≥ 200 mmHg)伴视乳头水肿。

（五）急性心包压塞

关键标准：影像显示大量心包积液，且行心包穿刺治疗。

（六）休克

关键标准：收缩压 \leq 80mmHg 伴乳酸 $>$ 3mmol/L。

（七）主动脉夹层

关键标准：急性发病伴收缩压 \geq 180mmHg，且伴影像显示主动脉夹层。

（八）重症病毒性心肌炎

关键标准：影像显示心力衰竭伴以下任意一种情形，肌酸激酶同工酶（CK-MB）较正常值上限增高5倍以上；肌钙蛋白较正常值上限增高5倍以上。

（九）主动脉瘤破裂

关键标准：影像显示主动脉瘤破裂。

二、呼吸系统

（一）重症支气管哮喘急性发作

关键标准：血气 PaO₂ $<$ 60mmHg 或 PaCO₂ $>$ 50mmHg 或行气管插管及有创呼吸机治疗。

（二）呼吸衰竭

关键标准：血气 PaO₂ $<$ 60mmHg 或 PaCO₂ $>$ 50mmHg 或行气管插管及有创呼吸机治疗。

（三）急性肺栓塞

关键标准：影像显示肺栓塞。

（四）急性呼吸窘迫综合征

关键标准：影像显示肺部渗出伴氧合指数 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200\text{mmHg}$ 。

（五）自发性气胸

关键标准：无 COPD 病史且无外伤史且影像显示气胸。

（六）大咯血

关键标准：就诊前一次性咯血 100ml 以上（或 24 小时咯血量超过 600ml），且应用垂体后叶素治疗或行急诊内镜（或介入）止血治疗。

三、消化系统

（一）急性危险性上消化道出血

关键标准：血红蛋白 $< 70\text{g/L}$ 且符合以下任意一种情形，乳酸 $> 3\text{mmol/L}$ ；行急诊内镜下止血；行急诊手术止血。

（二）急性重症胰腺炎

关键标准：影像显示胰腺出血、坏死。

（三）急性肝衰竭

关键标准：总胆红素 $> 150\text{umol/L}$ 。

（四）急性梗阻性化脓性胆管炎

关键标准：影像或内镜显示胆管炎症伴梗阻。

（五）急性肠梗阻

关键标准：影像显示肠梗阻。

（六）急性肠系膜缺血

关键标准：影像或介入造影显示肠系膜上动/静脉缺血。

（七）急性肠扭转

关键标准：影像显示肠扭转。

（八）消化道穿孔

关键标准：影像显示腹腔内游离气体或行急诊手术。

（九）肝性脑病

关键标准：血浆氨 $>40\mu\text{mol/L}$ 。

（十）急性阑尾炎

关键标准：行急诊手术。

四、内分泌系统

（一）糖尿病酮症酸中毒

关键标准：血糖 $>11\text{mmol/L}$ ，伴尿酮体阳性，且伴血 $\text{PH}<7.1$ 。

（二）非酮性高渗性糖尿病昏迷

关键标准：血糖 $>30\text{mmol/L}$ 伴 $2\times(\text{血}\text{K}^++\text{Na}^+) >300\text{mmol/L}$ 。

（三）甲亢危象

关键标准：心电图显示心率 >140 次/分，伴促甲状腺激素 $\text{TSH}<0.1\text{mU/L}$ ，且伴甲状腺素 T_4 增高。

（四）肾上腺皮质功能危象

关键标准：影像显示肾上腺改变伴血浆游离皮质醇（COR）任意时点低于正常。

（五）垂体危象

关键标准：影像显示垂体改变伴以下任意一种情形，血糖

<3.9mmol/L; 血乳酸>3mmol/L。

(六) 严重酸碱失衡及电解质紊乱

关键标准：符合以下任意一种情形，血 PH>7.6；血 PH<7；血 Ca²⁺>3.75mmol/L；血 Ca²⁺<2mmol/L；血 Na⁺>155mmol/L；血 Na⁺小于 120mmol/L；血 K⁺>6.5mmol/L；血 K⁺<2.5mmol/L。

五、神经系统

(一) 急性脑血管病

关键标准：影像显示出血或新发梗塞病灶。

(二) 癫痫大发作

关键标准：脑电图显示癫痫。

(三) 重症肌无力危象

关键标准：肌电图显示肌无力且行气管插管及有创呼吸机治疗。

(四) 自发性蛛网膜下腔出血

关键标准：无外伤史且影像显示蛛网膜下腔出血。

(五) 重症脑炎

关键标准：脑脊液蛋白增高伴细胞数增高。

(六) 格林巴利综合征

关键标准：急性发病伴肌电图显示外周神经损伤伴脑脊液蛋白增高且行气管插管及有创呼吸机治疗。

六、泌尿系统

(一) 急性肾功能衰竭

关键标准：48 小时内肌酐增加超过 40 $\mu\text{mol/L}$ 。

（二）溶血尿毒综合征

关键标准：网织红细胞大于 10%，伴血涂片可见异形（或破碎）红细胞，且伴急性肾功能衰竭。

（三）急性横纹肌溶解

关键标准：肌红蛋白大于 1000 $\mu\text{g/L}$ 伴急性肾功能衰竭。

（四）急性输尿管结石

关键标准：影像显示输尿管结石直径 $>0.5\text{cm}$ 伴肾盂积水。

七、血液系统

（一）急性溶血性贫血

关键标准：网织红细胞大于 10% 伴非结合胆红素 $\geq 30\mu\text{mol/L}$ 。

（二）弥散性血管内凝血

关键标准：血小板 $\leq 100 \times 10^9/\text{L}$ ，伴凝血酶原时间（PT）延长 3 秒以上，且伴 D-二聚体增高。

（三）急性血小板减少

关键标准：无血液病病史且伴血小板 $\leq 20 \times 10^9/\text{L}$ 。

（四）血栓性血小板减少性紫癜

关键标准：血小板 $\leq 50 \times 10^9/\text{L}$ ，伴血涂片可见异形（或破碎）红细胞，且伴急性肾衰竭。

八、意外伤害

（一）急性一氧化碳中毒

关键标准：碳氧血红蛋白 $>20\%$ 。

（二）急性亚硝酸盐中毒

关键标准：高铁血红蛋白 $>10\%$ 。

（三）蛇咬伤

关键标准：有咬伤部位图片证据且注射蛇毒血清治疗。

九、妇科危重症

（一）宫外孕破裂出血

关键标准：影像显示宫外孕破裂或行急诊手术。

（二）重度子痫

关键标准：影像显示妊娠状态，伴尿蛋白阳性，且伴肌酐 $>170\mu\text{mol/L}$ 。

（三）卵巢囊肿蒂扭转

关键标准：影像显示卵巢囊肿蒂扭转。

（四）胎盘早剥

关键标准：影像显示胎盘早剥。

十、儿科危重症

（一）小儿高热惊厥

关键标准：体温 $>39^{\circ}\text{C}$ 且应用以下任意一种药物，地西洋；苯巴比妥；水合氯醛；丙戊酸。

（二）急性睾丸扭转

关键标准：影像显示睾丸扭转。

十一、耳鼻喉科危重症

（一）急性喉炎/会厌炎

关键标准：影像或内镜证实。

十二、传染性疾病

关键标准：甲类传染病及按甲类管理的乙类传染病，包括鼠疫，霍乱，新型冠状病毒肺炎，炭疽，人感染高致病性禽流感，传染性非典型肺炎。